



MC-111- dépliant 3v hernie inguinale



## CONTACT :

Rendez-vous consultation chirurgie pédiatrique :

☎ 071/92.21.91 ou ☎ 071/92.25.11

Rendez-vous consultation anesthésie :


☎ 071/92.25.11 ( ou ☎ 071/92.33.80)

Hopital de jour pédiatrique : 071/92.13.71

Urgences : ☎ 071/92.34.33



[www.humani.be](http://www.humani.be)



## HERNIE INGUINALE

Cure d'hydrocèle  
et kyste du cordon



## ■ Qu'est-ce qu'une hernie inguinale, une hydrocèle ou un kyste du cordon?

La hernie inguinale, l'hydrocèle et le kyste du cordon sont dus à une anomalie de fermeture du canal péritonéo-vaginal (canal situé au niveau de l'aîne).

Durant la grossesse, chez les garçons, les testicules sont formés dans l'abdomen et descendent ensuite vers les bourses (scrotum), en passant par le canal inguinal.

Ce canal est censé se fermer à la fin de la grossesse. Cependant, il peut arriver que celui-ci ne se ferme pas ou incomplètement. Du liquide, de l'intestin grêle ou un ovaire (chez les filles) peut alors passer dans ce canal, une masse devient visible dans l'aîne ou le scrotum.

Le but de l'intervention est de fermer le canal.

## ■ Avant l'intervention

Le service des rendez-vous vous contactera afin de fixer un rendez-vous avec l'équipe d'anesthésie au moins 8 jours avant l'intervention. Si une semaine avant la date d'opération vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez contacter le ☎ **071/92.33.80**

Avant le jour de l'intervention, vous devrez effectuer une admission anticipée en passant par les admissions hospitalisation afin de réaliser les formalités administratives en vue de l'opération.

La veille de l'opération, vous serez contacté par l'hôpital, afin de confirmer l'heure de l'intervention. Nous vous indiquerons à quelle heure arriver ainsi que le moment et à partir de quand votre enfant devra cesser de boire et manger. Il est important qu'il soit à jeun pour l'opération.

## ■ L'intervention

L'opération se passe sous anesthésie générale (l'enfant dort complètement) et est associée à une anesthésie locale.

Il s'agit généralement d'une hospitalisation de jour (l'enfant rentre à la maison en fin de journée). Toutefois,

- ▶ si l'enfant est âgé de moins d'un an, il sera hospitalisé une nuit en pédiatrie pour surveillance
- ▶ s'il est porteur d'une maladie, l'anesthésiste peut décider d'hospitaliser l'enfant (une ou plusieurs nuits).

Le jour de l'opération, passez d'abord par les admissions pour inscrire votre enfant, ensuite montez avec lui à l'hôpital de jour pédiatrique au D1, 1<sup>er</sup> étage.

## ■ Après l'intervention

Au niveau de la cicatrice, du fil résorbable est utilisé (sous la peau). Il partira spontanément, rien ne doit être enlevé.

Sur la cicatrice, on applique également de la colle (biologique) ou des strips. Dès lors, aucun soin (désinfection ou pansement) n'est nécessaire à la maison. L'enfant peut prendre une douche ou un bain rapide à partir du lendemain de l'intervention (pas de piscine, ni bain de mer durant 1 mois).

À la sortie de l'hôpital, des anti-douleurs sont prescrits : paracétamol (ex : Dafalgan®), Perdolan®,... et ibuprofen (ex : Nurofen®), en fonction du poids. Ce traitement permet à votre enfant d'avoir moins mal et de retrouver ses activités normales le plus rapidement possible.

Un rendez-vous en chirurgie est prévu environ 10 à 15 jours après l'intervention.

Il est recommandé de ne pas pratiquer de sport durant 2 à 4 semaines.

L'enfant peut retourner à l'école après quelques jours.

## ■ Complications possibles

Les risques et complications de cette opération sont très rares. On peut toutefois observer:

- ▶ Un saignement, avec le plus souvent un hématome au niveau de la bourse (qui se résorbe spontanément)
- ▶ Une inflammation du cordon et apparition d'une poche d'eau, avec un gonflement de la bourse (qui se résorbe spontanément)
- ▶ Une infection au niveau de la cicatrice
- ▶ Une récurrence de la hernie (très rare)
- ▶ De manière très exceptionnelle, une atrophie du testicule

**En cas de problème, vous pouvez contacter la consultation de pédiatrie ou vous rendre aux urgences.**

